中學生自然研究叢書

鳥類圖譜

下 册

沐紹良編譯

王雲五 周建人 主編

商務印書館發行





58.081/51
126
24.

中學生自然研究叢書

鳥類圖譜

下冊

沐紹良編譯

王雲五 周建人 主編

商務印書館發行

58.1915
242
2.
中国科学院……
中科院植物所图书馆
S0012952

目　　次

下　册

白翅黑燕鷗　浮鷗……116

魚江郎　大鳳頭燕鷗……119

玄鷰　鷗……120

海貓　白鷗……123

斑鷗　海雀……124

花魁鳥　角鴨……127

沙雞　野鴿……128

傳書鳩　鴿……131

轆轤　金背斑鳩　斑鳩……132

火斑鳩　古銅色翅鴿……135

達摩鸚哥　佛法僧……136

赤喉蜂鳥　秦椒嘴……139

魚狗　白胸魚狗……140

小雉喀咕　郭公……143

杜鵑　花喀咕　筒鳥……144

紅翅鳳頭喀咕　鵖鳩……147

2668

戴勝 蚊母鳥……148
鷲鵜 鵂鶹……151
黃魚鴞 光足鵂鶹……152
虎鴞 倉鴞……155
雨燕 針尾雨燕 小雨燕……156
棕腹啄木鳥 小花啄打木 歪脖……159
山啄木鳥 花啄打木……160
八色鶇 山鷚……163
大鷚 華北沙鷚 濱鷚……164
冰雞兒 大花鷚……167
黃馬蘭花兒 黃顫兒 山鶺鴒……168
馬蘭花兒 黑背鶺鴒……171
相思鳥 畫眉……172
練鵲 灰斑鶲……175
赭練鵲 東方紅胸鶲……176
郊鶲 黃鶲……179
赤腹鶇 穿草雞……180
中國灰叢樹石棲 藍尾巴根子……183
花紅燕兒 紅點頦……184

燕　赤腰燕　西伯利亞岩燕……187
鶺鴒　暗黃臉鶺鴒　柳鵵……188
黃尾根柳鶯　黃眉柳鶯　蒼眉鷚……191
剖葦　小剖葦……192
太平鳥　灰鵙……195
伯勞　虎鵙　褐色紅尾伯勞……196
東方倒攀山雀　戴菊鳥　河北烏形山雀……199
陽明鳥　黃鳥……200
風鳥　比翼鳥……203
烏鴉　白脖烏……204
山烏　寒鴉……207
鵲　星鳥……208
管蓮子　噪林鳥……211
印度革瑞克　紅肋粉眼　旋木雀……212
梅花雀　文鳥　索娥……215
錫嘴　桑扈……216
花雞　交喙鳥……219
鶯　靠山紅……220
金絲雀　黃雀……223

家雀　山麻雀……………………………………………224
鳳頭雀　寒雀……………………………………………227
黃眉　大眉子……………………………………………228
鐵爪子　葦容兒…………………………………………231

鳥 類 圖 譜

下 册

1. 白翅黑燕鷗 *Chlidonias leucoptera* Temminck. 英名 White-winged Black Tern. 鷗科

自南歐至東亞,各地均有繁殖,我國南部亦有其蹤跡。翼長,嘴長而直,僅前端略向下方。尾呈燕尾狀,脚甚小,半蹼足。頭、頸及上背黑色(冬季白色,僅頭頂及上頸有黑紋)。小覆雨羽及翼灰白色,翕灰色。第一列撥風羽灰黑色,上尾筒及尾白色,下部及翼裏面黑色(冬季白色)。下尾筒白色。嘴夏季赤色,冬季黑色,脚赤橙色。尾略呈叉狀。幼鳥體色如冬羽,下部有褐色斑,尾灰色。羣棲於海,冬季逐北方種魚羣南下,故恆爲漁夫測知魚羣之標的物。食物以小魚、甲殼類、軟體類、蠕蟲類爲主。(圖:左,幼鳥;右,雌夏羽。)

2. 浮鷗 *Chlidonias leucopareia swinhoei* Mathews. 英名 Chinese Whiskered Tern. 鷗科


繁殖於我國南部及斐律賓羣島。頭頂黑色(冬季額白,頭頂及上頸有黑縱線),背面及體下部灰黑色(冬季下部白色),喉灰色,頸白色。尾短,略呈叉狀,嘴血紅色,脚朱色。幼鳥體色如冬羽,惟頭頂及上頸黑褐色,翕及尾有褐色斑紋。(圖:前,夏羽;後,雄幼鳥。)



1



2



1



2

1. 魚江郎 *Hydroprogne caspia caspia* Pallas. 英名 Caspian Tern. 鷗科

繁殖於歐、亞、美三洲之北部及非洲。我國則黑龍江一帶爲其繁殖區域。體形甚大，頭頂及上頸黑色。（冬季白色，有黑縱斑。）翕灰鼠色，尾較短，略呈叉狀，灰白色。體下部及上尾筒白色。嘴甚粗強，赤色，脚黑色。幼鳥頭頂有黑白縱斑，背面有暗色斑，嘴暗橙黃色，脚黑褐色。繁殖期在北半球之温帶地方爲 4–7 月。（圖:左，雄冬羽;右，雄夏羽。）

2. 大鳳頭燕鷗 *Thalasseus bergii cristatus* Stephens. 英名 Eastern Crested Tern. 鷗科

分布於我國東、南海沿岸、斐律賓、蘇門答臘、大洋洲等處。額白，頭頂及上頸黑色，各羽形成羽冠，混生白羽（冬季頭頂大部份白色）背面眞珠灰色，尾略淡。頸及體下部白色。嘴黃，基部帶綠色，脚褐黑色。幼鳥額及頭頂白色，有淡褐黑色縱斑。翕有黑色及淡黃色之斑紋。尾暗灰色，羽端白色。（圖爲雄鳥夏羽。）

1. 玄鷰 *Anous stolidus pileatus* Scopoli. 英名 Philippine Noddy. 鷗科

分布於斐律賓、印度洋及大洋洲一帶,我國福建等處亦有其踪跡。頭頂灰鼠色,額近於白色,額前有黑帶。背面暗褐色,第一列撥風羽及尾褐黑色。下部暗褐色,喉灰褐色,嘴黑色,脚褐黑色。尾呈扇形,略分叉。幼鳥體色稍淡,頭頂灰褐色額白色,眉斑甚闊,白色。(圖:前,雌成鳥;後,雄幼鳥。)

2. 鷗 *Larus canus major* Middendorff. 英名 Asiatic Common Gull. 鷗科

繁殖於西伯利亞東部及堪察加,冬季南下至我國。夏季頭純白(冬季密生暗褐色縱斑),頸、體下部及尾白色。翕淡灰色,外側第一列撥風羽黑色,前端有闊白斑。內側第一列及第二列撥風羽灰色,前端白色。虹彩黃色或乳脂色,眼瞼緣橙黃色,嘴及脚黃綠色。幼鳥頭及頸淡白色,有灰褐色斑紋。翕褐灰色,羽緣淡褐色。體下部淡白色,有褐色斑紋。嘴褐黃色,脚赭褐色。(圖:左,雄夏羽;右,雄幼鳥。)




1



2



1



2

1. 海貓(又名黑尾鷗) *Larus crassirostris* Vieillot. 英名 Black-tailed Gull. 鷗科

產於日本等處,冬季在我國南部。夏季頭頸純白(冬季略帶灰褐色)。翕灰褐色,第一及第二列撥風羽灰色,前端白色。其他各羽黑色。尾白,中央尾之亞帶黑色,末端白色。體下部純白。嘴淡黃色,亞帶爲黑輪,前端赤色。脚略帶黃色,虹彩淡黃色。幼鳥背面暗褐色,羽緣淡色。翼及尾褐黑色,顏灰白色。體下部淡褐色。嘴、脚肉色,惟嘴之前端黑色。五月產卵。(圖:左,雄夏羽;右,雌幼鳥。)

2. 白鷗 *Larus hyperboreus* Gunnerus. 英名 Glaucous Gull. 鷗科

產於歐、美北極圈,冬季南下,在亞洲至我國沿海及日本。成鳥之翕爲極淡之淡灰色,撥風羽白色,前端灰色。其他部份純白。嘴黃色,下嘴角有赤斑1個。脚肉色,虹彩淡黃色(以上第四年夏羽及冬羽)。頭及頸白色,頸部略有淡棕色縱斑;又有暗色眼斑1個。體下部白色,惟腹部略帶棕色。第一列撥風羽白色,外瓣略帶棕色。尾白,略有斑紋。(第三年冬羽)幼鳥之翕淡黃褐色,頭灰色,略有淡褐色縱斑。體下部及撥風羽淡棕色,尾有白斑,並有棕灰色線及黃色亞帶。嘴肉色,前端黑褐色,脚淡紅色,虹彩褐色。(圖:左,雌幼鳥;右,雄冬羽。)

1. 斑鷗 *Brachyramphus marmoratus perdix* Pallas. 英名 Partridge Auk. 海雀科

繁殖於堪察加,我國東三省及山東、青島亦有其踪跡。夏季背面褐色,有黄褐色及淡黄色斑紋。腮及上喉白色,略有黑斑。體下部、上胸以下白色,有黑褐色斑紋。冬季背面黑灰色,肩羽之大部份白色,頸有白輪,體下部純白。嘴黑褐色,脚趾淡肉色,蹼膜暗灰色,虹彩暗褐色。(圖:左,雌鳥夏羽;右,雄鳥冬羽。)

2. 海雀 *Synthliboramphus antiquus* Gmelin. 英名 Ancient Auk. 海雀科

繁殖於阿拉斯加附近、阿留西安、可孟達羣島、堪察加及黑龍江沿岸等處,冬季南下至我國南部沿岸。雌雄同色,夏季頭頂、腮、喉、後頸、及脇黑色,上頸、後頸下部側方及上翕有白色飾羽。背暗灰色,翼及尾黑色。體下部前頸以下純白。冬季喉及前頸純白,頭側有白帶。嘴灰白色,鼻孔嘴峯及上、下嘴基部黑色,跗蹠及趾蒼灰色或淡紅色, 蹼膜灰黑色, 虹彩暗褐色。(圖:左,雄夏羽;右,雄冬羽。)



1



2



1



2

1. 花魁鳥 *Lunda cirrhata* Pallas. 英名 Tufted Puffin. 海雀科

繁殖於白令海及阿拉斯加等處,冬季南下。雌雄同色,夏季背面黑色,額、腮之狹線、及自嘴基部至頭側部份均呈白色,眼後方之流蘇狀大飾羽囊黃色。體下部煙褐色,喉、頸側及頭側褐黑色,下覆雨羽褐灰色。虹彩乳白色,嘴前半部鮭赤色或赤橙色,後半部橄欖黃色,上嘴有半圓凹部 4 處, 嘴上隆起物蘋果綠色。脚鮭赤色,趾爪黑褐色。冬季嘴基一半之角質被覆部橄欖綠色,略帶暗褐色。顏面黑褐色,眼後方有淡色斑 1 ,無流蘇狀黃飾羽。(圖:左,雄冬羽;右,雄夏羽。)

2. 角鷗 *Fratercula corniculata* Naumann. 英名 Horned Puffin. 海雀科


繁殖於堪察加、可孟達、阿留西安羣島及阿拉斯加等處。雌雄同色,夏季頭頂灰褐色,背面黑色,頭側白色,圍眼部後方有細長之灰色線。頸輪黑褐色,下部白色。虹彩蒼灰色,眼瞼緣赤色,眼下部有革質之細長隆起物, 上部有針狀柔軟附屬物,均黑褐色。嘴前端$\frac{1}{3}$鮭赤色,中央部分褐色,基部之$\frac{2}{3}$檸檬黃色,口角隆起部橙黃色。脚赤橙色。冬季嘴基部之$\frac{2}{3}$不被角質物,褐色,口角灰白色,前端僅上嘴赤色,下嘴則爲褐色。眼瞼褐色,頭側灰褐色。(圖:左,冬羽;右,夏羽。)

1. 沙雞（又名鷄雞）*Syrrhaptes paradoxus* Pallas. 英名 Pallas's Sand-Grouse. 沙雞科

繁殖於歐、亞二洲之北部，冬季南下至我國，意大利等處。體堅強，嘴粗短而小，脚甚短，脚趾全部被毛，後趾缺。翼及尾均延長，尾羽 16 枚，呈楔形。多產於沙漠，體色有保護作用。雄者額、眉斑、腮、喉及頭側銹黃色，後頭、上頸及後頸側方灰色。背面及覆雨羽黃色，前者有黑斑。上尾筒有灰色縱斑。尾黃色，有灰黑色横斑，其延長部份黑色。胸葡萄灰色，横斷下胸有白輪。腹黑，略有白斑，腹以下葡萄灰色。下尾筒白色。雌者頭部、上頸、後頸、及胸側有黑斑或黑縱線，喉與胸之間有黑色細線。虹彩暗褐色，嘴淡蒼色。（圖:前，雄;後，雌。）

2. 野鴿 *Columba livia intermedia* Strickland. 英名 Indian Blue Rock-Pigeon. 鳩鴿科


分布於我國海南島及印度、錫蘭、緬甸等處。嘴短小，前端彎曲。鼻孔開口於上嘴基部柔軟之膜內。翼圓而長，約 230 毫米。脚短，趾基部無蹼。頭暗紫色，頸部有紫綠色光澤。背灰鼠色，下背之色較淡。腰暗褐色，尾羽末端有黑帶，翼有黑帶 2 條。棲息森林中，以樹枝營巢樹上，甚粗雜。（圖爲雄鳥）



1



2



1



2

1. 傳書鳩 *Columba livia* var. *domestica* Linnaeus. 英名 Blue Checkered Liegeois. 鳩鴿科

品種甚多,本種爲其中之一。體肥大,頭及嘴均長,蠟膜高,眼大。頭部灰褐色,前頸及上胸略帶淡紅色,後頸暗綠色,有光澤。背面灰白色,有綠褐色斑;上胸以下白色。脚肉色,眼橙黃色,脚褐色。有歸家本能,可使之傳書,在軍事上價値甚大,故頗著名。(圖爲雄鳥)

2. 鴿 *Columba livia* var. *domestica* Linnaeus. 英名 Dove-cot Pigeon. 鳩鴿科

爲世界各國到處均有之家禽。現今所有之玩賞、食用、傳書等數百品種,均由本種改良而成。體色不一,通常有白色、黑色、黃色、黑白斑等類。本種之傳書能力,僅限於短距離,不及傳書鳩。(圖:左,蒼色小斑型;(雄)中,蒼色二黑帶型(與原種甚近)(雄);右,赤色型(雌))

1. 鵓鸕（又名山石鴿） *Columba rupestris rupestris* Pallas. 英名 Blue Hill-Pigeon. 鳩鴿科

分布於我國北部，四川、西藏及西伯利亞東部。形似野鴿，然尾羽有灰白色闊帶。最外側羽褐色，前端白色。上尾筒暗褐色。翼有黑色闊帶 2 條。虹彩橙黃色或淡紅色，嘴黑褐色，蠟膜白色或淡白色。脚珊瑚色。幼鳥頸部無金屬光澤，覆雨羽及其他背羽有灰白色細緣。（圖爲雄鳥）

2. 金背斑鳩（又名雉鳩） *Streptopelia orientalis orientalis* Latham. 英名 Eastern Turtle-Dove. 鳩鴿科

分布於西伯利亞中南部及我國蒙古等處。額及頭頂灰色，上頸有灰鼠色羽緣之黑羽，形成一大斑。下背、腰及上尾筒蒼褐色，肩羽暗褐色，有銹赤色闊緣。尾灰黑色，中央羽前端有淡灰色細緣。體下部淡葡萄色，喉及上胸暗灰色，腮及上喉淡白色。虹彩赤橙色，嘴蒼灰色，眼瞼紫蒼色，脚紫赤色。（圖爲雄鳥）

3. 斑鳩（北名灰斑鳩） *Streptopelia decaocto decaocto* Frivalszky. 英名 Indian Ring-Dove. 鳩鴿科


我國河北、山東、湖北、甘肅、福建、東三省及蒙古均有分布。雌雄同色，惟雌者體形較小。頭頂及頸淡灰色，略帶薔薇色，有黑色後頸輪。背面褐黃色，腰灰色。撥風羽黑褐色，第二列撥風羽灰鼠色，第三列撥風羽、小覆雨羽及肩羽與背同色。大、中覆雨羽蒼灰色。腮及上喉白色，以下至下尾筒蒼灰色。下覆雨羽灰白色，腋羽淡灰色。（圖爲雌鳥）



1



2



3



1



2

1. 火斑鳩 *Oenopopelia tranquebarica humilis* Temminck. 英名 Burmese Red Turtle-Dove. 鳩鴿科

分布於我國、西伯利亞東南部、及斐律賓等處。雌雄異色。雄者頭及頸灰鼠色，上頸有黑頸輪半環，翕、肩羽及覆雨羽葡萄赤褐色，下背、腰及上尾筒蒼灰色。翼暗褐色，第二列撥風羽與肩羽同色。中央尾灰褐色，外側尾羽黑褐色，外瓣及前端灰白色。腮灰白色或淡灰色，體下部之大部份較背略淡，至下腹及下尾筒始近於白色。虹彩暗褐色，嘴黑褐色，脚赤褐色。雌者背面褐色，上頸亦有黑頸輪半環，體下部淡灰色。(圖:左,雄;右,雌。)

2. 古銅色翅鴿 *Chalcophaps indica indica* Linnaeus. 英名 Indian Emerald Dove. 鳩鴿科

分布於印度及南洋羣島等處，我國南部及海南島亦偶見之。額及眉斑白色，頭頂及上頸蒼鉛色，背及翼金綠色，上背之羽緣蒼鉛色。下背腰及上尾筒黑褐色。下背有 2 條灰色帶，其間復有青銅色帶，羽緣暗褐色。頰、喉、頸側及胸紫葡萄色，腹灰葡萄色。尾汚黑色。背部綠色銅光因個體之不同其強度大有差異。嘴珊瑚色，圍眼部肉色，虹彩暗紅色，脚紫赤色。雌者通常暗褐色，額暗灰色，眉斑較細，自後頭至背部褐色。體下部赤褐色，混以灰色。(圖:左,雌;右,雄。)

1. 達摩鸚哥 *Psittacula fasciata* Müller. 英名 Moustache Parrakeet. 鸚鵡科

分布於我國南部、海南島、交趾支那、安達曼羣島、印度及緬甸。體色甚美,供玩賞。嘴基部闊,上嘴鈎狀部有隆起線,鈎狀部內面有鑪狀面。舌端肉質。尾長,成楔形。翼短,跗蹠亦短。雄者背面綠色,頭蒼灰色,眼前帶及粗頰線黑色,後頸輪綠寶石色,喉及胸葡萄赤色,下腹及下尾筒綠色,略帶蒼色。中央尾蒼色,基部之羽緣綠色。雌者前頸之葡萄色延長至後頸。嘴雄者紅,下嘴黑,雌者上下嘴均黑。(圖:前,雌;後,雄。)

2. 佛法僧(又名三寶鳥,北名老鴰翠) *Eurystomus orientalis calonyx* Sharpe. 英名 Himalayan Broad-billed Roller. 佛法僧科

繁殖於我國北部、中部、喜馬拉雅山、及西伯利亞東部等處,冬季南下。嘴闊,峯線圓,前端呈鈎狀。跗蹠短,外趾與中趾基部駢連。趾爪彎曲。翼長而圓。頭及頭側褐黑色,背面暗綠色。撥風羽黑色,外緣暗蒼色。尾羽黑色,外緣基部蒼色。腮有小白點。喉蒼色,有淡色縱斑。喉以下蒼綠色。嘴及脚赤色,嘴端黑色。虹彩暗褐色。幼鳥體色較暗,嘴黑色,下嘴略帶赤色。鳴聲奇特,產卵於赤松及其他樹幹之空洞內。食物以甲蟲類爲主。不能高飛。(圖 左,幼鳥;右,成鳥。)



1



2



1



2

1. 赤喉蜂鳥 *Archilochus colubris* Linnaeus. 英名 Ruby-throated Hummingbird. 蜂鳥科

產於南北美洲。體形甚小，極美麗。嘴細長，兩嘴緣呈細鋸齒狀。跗蹠短小，被羽毛。翼長而尖。雌雄異色：雄者背面金屬綠色，翼暗褐色，略帶紫色光澤。中央尾 2 枚，與背同色，上部之其他部份紫色，有光澤。腮、眼下部、耳羽及喉側天鵝絨黑色，眼後方有小白斑。喉全部紅寶石色，因光線照射角度之不同，能閃爍為黃金色或淡綠色。上胸淡白色，上胸以下濃灰色。腰側及腿部有白色流蘇狀羽。下尾筒褐灰色，羽緣淡白色。雌者喉部白色，尾羽外側羽之前端白色。全長約 80 毫米，在庭園中吸食花蜜，其形如蜂，故名。（圖為雄鳥）

2. 秦椒嘴（又名鵲雀翠） *Halcyon pileata* Boddaert. 英名 Black-capped Kingfisher. 魚狗科

產於我國，冬季南下。體色甚美：頭頂、顏及耳羽黑色，背面紫蒼色，上尾筒及尾同色。覆雨羽黑色，後頸輪、喉及胸之中部白色，體側、腹及下尾筒橙黃色。（圖為雄鳥）

1. 魚狗（又名翠鳥） *Alcedo ispida bengalensis.* 英名 Little Kingfisher. 魚狗科

產於我國中部及北部等處。長約 165 毫米。頭大，頭頂及頭後有藍色及黑色橫紋。嘴長而尖。喉白，胸腹呈赭黃色。背及翼之上部呈帶綠的藍色。翼之其他部分顏色較深。尾羽短，上面深藍色，下面黑色。常棲息池沼旁，捕食魚類。造窠在岸邊穴內，或自己營造，或利用鼠之舊穴。

2. 白胸魚狗 *Halcyon smyrnensis fusca* Boddaert. 英名 Indian White-breasted Kingfisher. 魚狗科

分布於我國南部，印度、緬甸、馬來半島等處。腮、喉及胸之中央白色，頭、頸及剩餘之體下部均赤栗色。間肩部、肩部、第三列撥風羽及尾蒼綠色。背面、腰及上尾筒深蒼色。小覆雨羽栗褐色，中覆雨羽褐色，大覆雨羽及第一列覆雨羽暗綠色。第一列撥風羽黑色，外瓣有蒼色闊帶，內瓣白色。下覆雨羽栗色。（圖爲成鳥）



1

2



1



2

1. 小雉喀咕 *Centropus bengalensis lignator* Swinhoe. 英名 Formosan Lesser Coucal. 杜鵑科

分布於我國福建、廣東等處。嘴短,上嘴彎曲。跗蹠有蛇腹狀鱗,甚強大,後趾有距狀長爪。尾圓,鼻孔露出。夏季、翕、肩羽、及翼羽暗栗色,翕及覆雨羽有黃白色軸斑。其他部份綠黑色,有光澤。上尾筒及尾羽斑紋之有無隨季節而變化。冬季,頭、翕、肩羽及覆雨羽暗褐色,羽緣赤褐色,有黃白色羽軸。腰及上尾筒赤褐色,有黑横斑;翼尾與夏羽同,惟後端爲淡黃色。體下部黃色,喉與腹之間淡白色,胸側、脇及腿有暗褐色横斑。嘴夏季黑色,冬季黃色。脚黑,虹彩紅色。棲息平地之竹林及甘蔗田等處,鳴聲特殊,捕食昆蟲種子等。(圖:前,冬羽;後,夏羽。)

2. 郭公(又名布穀,鳲鳩, 北名喀咕) *Cuculus canorus telephonus* Heine. 英名 Eastern Cuckoo. 杜鵑科

繁殖於亞洲北部、中部,東至我國、日本。冬季至我國南部、南洋羣島及印度等處越冬。背面鉛灰色,翕及翼略帶橄欖色。撥風羽暗褐色,內瓣有白色刻斑。外側尾外緣白色,一部份有白横斑。尾羽褐黑色,前端白色,各羽有兩重白斑 7 個。頭側、頸、腮及喉淡灰色,以下白色,有褐色細横斑,下腹及下尾筒略帶黃色。雌者體形略小,喉略帶赤褐色。後頭有白斑。產卵於伯勞等巢中。(圖:上,雄幼鳥;下,雄成鳥。)

1. 杜鵑（又名小喀咕） *Cuculus poliocephalus poliocephalus* Latham. 英名 Little Cuckoo. 杜鵑科


繁殖於我國、西伯利亞東部、喜馬拉雅山等處。形似郭公及筒鳥（見下），但體形甚小，體下部亦有闊橫斑。雌鳥體色偶爲赤色。雌者鳴聲爲「ㄆ丨——」,「ㄆ丨——」,雄者則爲「ㄊ丨ㄝ　ㄆㄣ　ㄎㄚ　ㄎㄝ　ㄊㄚ　ㄎㄚ」。晝飛鳴於樹上,產卵於鶯巢中,有時偶亦產於黑鶇、鷦鷯等巢中。（圖爲雄鳥）

2. 花喀咕（又名光棍好過） *Cuculus micropterus micropterus* Gould. 英名 Indian Cuckoo. 杜鵑科

產於我國中部及南部等處，在印度南部、爪哇、蘇門答臘等處越冬。與筒鳥酷似,惟尾羽前端之白色部分較多，體下部黑橫斑較闊。產卵於知目鳥科鳥類（見後）之巢中。

3. 筒鳥 *Cuculus optatus optatus* Gould. 英名 Himalyan Cuckoo. 杜鵑科

分布於我國北部、印度、中亞細亞、西伯利亞東部及西部,形與郭公酷似,但體下部之黑橫斑較闊,翼緣無斑紋或雖有而不多。雌鳥體羽恆爲赤色。上部爲極美之赤褐色,有黑色粗橫斑;下部白色或淡白色,亦有同樣橫斑。幼鳥變化甚多,通常爲黑褐色,秋季換羽。鳴聲爲「ㄆㄨㄥ」「ㄆㄨㄥ」。產卵於鵐、練鵲、綉眼等巢內。（圖:前,雄成鳥;後,雌鳥赤色型。）


1
2
3



1



2

1. 紅翅鳳頭喀咕 *Clamator coromandus* Linnaeus. 英名 Red-winged Crested Cuckoo. 杜鵑科

分布於我國、緬甸、印度、錫蘭、馬來半島、爪哇、蘇門答臘、斐律賓等處。頭黑,有蒼色光澤,形成一美麗之羽冠。後頸輪白色。背面黑色,有蒼綠色光澤。肩羽及第三列撥風羽橄欖綠色,亦有光澤。翼之剩餘部份栗色,前端褐色。尾堇黑色,外側羽端白色。喉栗黃色。上胸淡黃色,脇及腹灰鼠色。下尾筒與尾羽同色。(圖爲雄鳥)

2. 鷍鳩(又名慈悲心鳥) *Hierococcyx fugax hyperythrus* Gould. 英名 Chinese Hawk-Cuckoo. 杜鵑科

繁殖於我國北部、日本及西伯利亞東南部,冬季南下至我國南部,斐律賓等處。驟見之頗似小形之鷹。背面灰褐色,頸部常有白羽。翼羽暗褐色,內瓣有灰白色横斑。尾羽褐灰色,前端銹色,以下有黑色闊帶,再下復有 3–4 條銹色細帶。腮灰褐色,喉淡白色,喉以下淡銹赤色,各羽基部白色,故有不分明之灰白色縱斑。後下部及下尾筒白色,下覆雨羽淡銹色。虹彩橙黃色,脚黃色。嘴褐黑色,前部鼻孔附近及下嘴略帶黃色。體下部淡白色,有黑褐色縱斑。產卵於琉璃鳥、青鷂等巢中。(圖:前,雄成鳥;後,雄幼鳥。)

1. 戴勝（北名呼哱哱、山㗰㗰） *Upupa epops saturata* Lounberg. 英名 Tibetan Hoopoe. 戴勝科


繁殖於我國北部、西藏及西伯利亞東部等處。嘴長，略形彎曲。跗蹠短，第三趾與第四趾基部駢連。翼闊尾短。頭部羽冠頗大，逆豎時呈扇狀。紅黃褐色，羽端有闊黑斑，後方末端附近有白帶。背黑褐色，下背黑色，有乳白色帶。腰白色。上尾筒黑色，基部白色。翼羽黑色，有白帶數條。頭側、喉及胸葡萄褐色，胸以下淡白色。脇有黑褐色縱斑。虹彩暗褐色。棲息於原野，飛翔甚慢。捕食昆蟲蠕蟲等，在地面上步行甚快。巢營於樹洞、岩壁等空隙中。（圖爲雌鳥）

2. 蚊母鳥（北名貼樹皮、鬼鳥） *Caprimulgus indicus jotaka* Temm. & Schl. 英名 Japanese Jungle Nightjar. 夜鷹科


繁殖於我國北部、日本及西伯利亞東部等處。冬季南下。嘴之裸出部短小扁平，前端略成鉤狀。口角甚深，故開張時頗大，能捕食空中之有翅昆蟲。口角部另有剛毛甚長。翼長而尖。雄者背面灰色，有黑色斑點及褐色蟲蠹斑，覆雨羽及尾羽與背同色，有黃白色圓斑。撥風羽黑褐色，喉側各有白斑 1 個。雌者白斑較小。日中匿於暗處，黃昏後飛翔於原野間覓食。（圖爲雄鳥）




1



2



1



2

1. 鵟鴞(又名鵰鴞、角鴟、怪鴟、老兎、北名猫頭鷹) *Bubo bubo tenuipes* Clark. 英名 Clark's Eagle-Owl. 鴞科

產於我國北部等處。頭大,頸短,頭側有角羽。嘴銳利,前端成鉤狀,上有蠟膜,且被羽毛。跗蹠短而強,密被羽毛,爪銳。翼圓,尾短,眼大,眼球常向左右移動。雌者體形大於雄者。背面赤褐色,有黑斑。腰及上尾筒銹褐色,有黑橫斑。撥風羽黑褐色,略帶黃色,有黑色蟲蠹斑。尾赭褐色,有黑橫斑及斑紋。顏面赤灰色,有黑色軸斑及橫斑。喉淡黃色,喉以下赤褐色,有黑縱斑及細橫斑。嘴及爪灰黑色,虹彩橙黃色。夜出偷襲各種獵獲之鳥類,有時捕食野兎野鼠等。營巢於岩隙或地上,鳴聲特殊。(圖爲雄鳥)

2. 鵂鶹(又名夜貓子) *Otus scops japonicus* Temm. & Schl. 英名 Eastern Scops Owl. 鴞科

分布於我國北部及日本等處,體色分灰色型及赤色型 2 種:灰色型背面灰色,各處有黃褐色或淡黃色斑紋。頭頂有黑褐色縱斑。翼暗褐色,有淡白色及黃褐色之斑紋。尾與翼同色,有淡褐色橫帶。肩羽有大白斑,羽端黑色。體下部之色較背稍淡,自上胸至腹有黑褐色縱斑。眉斑淡白色,角羽甚小。赤色型之體色,卽以赤色代入上述灰色型之灰色部份。

1. 黃魚鴞 *Ketupa ketupa flavipes* Hodgson. 英名 Tawny Fish-Owl. 鴞科

分布於我國南部（安徽、長江下游及香港）及喜馬拉雅山。背面褐黑色，羽緣淡黃褐色。眼前部白色，耳羽黃褐色，羽軸黑色。肩羽之外側及大覆雨羽外瓣黃褐色，其他覆雨羽及尾羽暗褐色，有黃褐色橫斑，各羽前端同色。體下部黃褐色，有暗褐色粗軸斑。喉白色。幼鳥體下部橙黃褐色，羽軸之左右有不分明淡色橫線。跗蹠之一半被羽毛，成鳥爲淡白色，幼鳥爲灰鼠色。趾裏面亦有針形物。捕食魚蟹。（圖爲雄鳥）

2. 光足鵂鶹 *Otus Bakkamoena glabripes* Swinhoe. 英名 Bare-toed Scops Owl. 鴞科

分布於我國南部（江西、安徽、浙江、福建、廣東、雲南諸省）及台灣。普通體呈灰色，有時爲褐赤色，又兩者之中間型（褐色）亦有。趾完全裸出。（圖爲雌鳥）




1



2



1



2

1. 虎鴞（又名彪木兎、長耳木兎） *Asio otus otus* Linnaeus. 英名 Long-eared Owl. 鴟科

分布於北歐、亞洲及非洲西北部，東至我國及日本。顏盤淡黃褐色，眼前部有黑斑。角羽甚長，黑褐色，外緣黃褐色，內緣灰白色。頭頸白色，羽端黑褐色。背面灰白色，混以淡黃褐色，有黑褐色縱斑及蟲蠹斑。撥風羽及尾羽黃褐色，有褐色横斑。體下部較背稍淡，有褐色縱斑，腹部混生横斑。脚趾全部被黃色羽毛。本種另有淡色型者，體下部淡白色，背部之黃褐色亦甚淡。本種在日間亦有發現。拙於飛翔。晚間捕食野鼠，故爲益鳥。（圖爲淡色型雄鳥）

2. 倉鴞(又名梟鵂) *Asio flammeus flammeus* Pontoppidan. 英名 Short-eared Owl. 鴟科

繁殖於歐洲及西伯利亞，冬季南下至北非、我國及日本亦有其踪跡。本種體色亦分濃淡二型。通常眼盤淡黃色，圍眼部黑色，角羽極小。背面黃褐色，有黑色縱斑。腮白色，腮以下淡黃色。胸部及腹部有褐色縱斑。脚趾全部被淡黃色羽毛。（圖爲淡色型雄鳥）

1. 雨燕 *Micropus pacificus pacificus* Latham. 英名 Large White-rumped Swift. 雨燕科


繁殖於我國北部、西伯利亞東部及日本，在我國南部及印度地方越冬。體形與燕相似，脚趾短而強，趾爪銳利，趾被羽毛。翼長而尖。嘴短闊。尾分叉。體上部黑褐色，背黑色，秋季羽緣淡白色。腰有白色帶，且有黑色之小軸斑。腮及喉與腰同色，喉以下暗褐色，羽緣黑色。本種在雨天前後出現，飛翔迅速。（圖爲雄鳥）

2. 針尾雨燕 *Chaetura caudacuta caudacuta* Latham. 英名 Needle-tailed Swift. 雨燕科

繁殖於我國北部及西伯利亞東部、日本等處，形大。前額有淡白色斑，頭黑褐色，有綠色金屬光澤。背及腰灰褐色。翼及尾黑色，亦有綠色光澤。第三列撥風羽有白斑。尾羽軸成針狀，不分叉。（圖爲雄鳥）

3. 小雨燕 *Collocalia fuciphaga rukensis* Kuroda. 英名 Ruk Island Swiftet. 雨燕科

產南洋島上，形狀和雨燕相似，但較小，背上暗烟褐色，略帶葡萄綠色。下面一般暗褐色，尾亦分叉，但甚淺。本屬有數種能在岩壁、洞穴等處造特別的巢，可供食用，稱爲燕窩。（圖爲雌鳥）




1




3


2



3



2



1

1. 棕腹啄木鳥 *Dryobates hyperythrus subrufinus* Cabanis. & Heine. 英名 Chinese Rufous-bellied Woodpecker. 啄木鳥科

分布於我國北部及四川、雲南等省。眼前部及前額乳白色，頭頂及後頸赤色。背面黑色，有白色闊橫斑。覆雨羽及翼羽黑色。撥風羽之兩瓣有白斑。中央尾羽黑色。外側羽黑色，有白斑。頭側及腮淡白色。腮以下至胸腹部棕褐色，下腹及其側邊薔薇赤色。下脇羽白色，有黑色細橫斑。下覆雨羽白色，有黑斑。上嘴及下嘴基部黑褐色，下嘴之其他部份淡黃色。脚蒼灰色。雌鳥頭頂黑色。（圖為雄鳥）

2. 小花啅打木 *Dryobates minor amurensis* Buturlin. 英名 Amur Lesser Spotted Woodpecker. 啄木鳥科

分布於我國黑龍江、烏蘇里、庫頁島及北海道等處。背部黑色，有白色橫斑。鼻毛赭褐色。額及眼前部淡白色，頭頂淡紅色，頭側有黑帶。頰線黑色，與頸側之三角黑斑相連。體下部淡白色。體側及胸淡褐色，有少數黑色細縱斑。外側尾羽基部有黑斑。雌者頭頂無紅色。（圖為雄鳥）

3. 歪脖 *Jynx torquilla japonica* Bonaporte. 英名 Eastern Wryneck. 啄木鳥科

分布於我國北部，西伯利亞東部及日本北部。背面灰色，密佈褐色蟲蠹斑。上頸、背之中央、眉羽及第三列撥風羽有黑色縱斑。尾灰黃色有褐色蟲蠹斑，並有黑色橫帶 5—6 條。體下部淡黃色，腹之中部白色，喉及上胸有黑褐色橫線，至腹部有箭鏃狀黑斑。喜食昆蟲，尤喜食蟻，見蟻羣時伸縮其長舌捕食之，疾如閃電。（圖為雄鳥）

1. 山啄木鳥 *Picus canus jessoensis* Stejneger. 英名 Japanese Black-naped Green Woodpecker. 啄木鳥科

產於我國北部及西伯利亞東部等處。頭巨大,頸細。嘴扁平,呈楔形,甚堅強,鼻孔被毛。舌細長,富有骨質,前端呈羽狀。頸部有強筋1對,頗有助於嘴之穿孔於樹木,以獲得大部份之食物。尾長而堅強,在攀緣樹木時能支持身體。跗蹠短,爪銳利。雄者自額至頭頂赤色,以下呈灰鼠色,上頸略有黑斑,頭側淡灰色。背、肩羽及覆雨羽綠色,略帶橄欖黃色。腰及上尾筒羽端金黃色。眼前及頰線黑色,撥風羽黑褐色。內外瓣有淡黃色横斑。尾羽橄欖黑色。體下部淡灰色,下尾筒灰褐色。雌者體色與雄者同,但頭部無赤色,有時僅略有赤色斑紋。飛翔頗速。(圖爲雄鳥)

2. 花啄打木(又名臭啄打木) *Dryobates major tscherskii* Buturlin. 英名 Tscherski's Great Spotted Woodpecker. 啄木鳥科

分布於我國東北部及日本等處。背黑色,額及耳羽白色,後頭有紅斑。肩羽淡黃色,自嘴基部至耳羽下及頸側有丁字形粗黑線。體下部淡黃色,下腹及下尾筒紅色。覆雨羽及翼羽黑色,有淡白色横斑。(圖爲雄鳥)


2
1


1
2

1. 八色鶇 *Pitta nympha nympha* Temm. & Schl. 英名 Fairy Pitta. 八色鶇科

繁殖於我國東南部及台灣等處。嘴強大，翼短圓，尾短。跗蹠長。體色甚美，由綠、蒼、紫、黃、赤、黑等色配合。額、頭頂、及後頭栗色，頭部中央線、頭側、上頸、後頸及腮黑色。眉斑甚長，黃色。翕綠寶石色。腰、小覆雨羽及上尾筒蒼色，有光澤。尾黑，末端蒼綠色。第二、三列撥風羽及背綠色。小翼、下覆雨羽、腋羽第一列覆雨羽及第一列撥風羽黑色。喉白色，胸、腹側及脇淡黃色。腹中部及下尾筒朱紅色。嘴黑，脚黃。棲息森林中，五月產卵。鳴聲爲「ㄆㄚ　ㄛ」「ㄆㄚ　ㄛ」。（圖爲雄鳥）

2. 山鷚 *Prunella montanella* Pallas. 英名 Chinese Mountain Hedge-Sparrow. 岩鷚科

繁殖於西伯利亞，冬季在我國北部及日本等處。形似雀，但嘴之前端較尖，基部較闊。跗蹠短。雌雄同色，額及頭頂有褐色帶。眉斑甚長，黃色。腮、喉、胸及脇淡黃褐色。頸側灰色，翕及背暗栗色，羽緣灰色。腰及上尾筒淡褐色，各羽略有暗色斑。大、中覆雨羽前端有小白斑。尾褐色，下尾筒淡黃色。性遲鈍，畏人。營巢於岩隙等處。食物爲昆蟲、種子等。鳴聲悅耳。（圖爲雄鳥）

1. **大鷚**（北名阿鷚兒、叫天子兒） *Alauda arvensis pekinensis* Swinhoe. 英名 North China Skylark. 鷚科


繁殖於堪察加及西伯利亞東部，冬季在華北（北平）。爲鷚類中之最大者。體色略似華北沙鷚，（見下）惟富銹赤色。（圖爲雄鳥）

2. **華北沙鷚** *Calandrella rufescens cheleënsis* Swinhoe. 英名 North Chinese Sand Lark. 鷚科

繁殖於我國北部，冬季在北平附近。嘴粗短，跗蹠細長，後趾爪甚長。翼長，尾略凹。體背土褐色，羽緣砂色。下部白色，上胸有淡褐色縱斑。全體甚小。產於沙漠、平野等處，營盃狀之巢於地上，食物爲昆蟲、蠕蟲、種子等。雄鳥鳴聲悅耳。（圖爲雄鳥）

3. **濱鷚**（北名黃眉獾敬德） *Chionophilos alpestris flavus* Gmelin. 英名 Shore Lark. 鷚科

繁殖於北歐及北亞，冬季南下至我國、南歐北美等處。額、眉斑、頸側及喉白色，略帶淡黃色。頭頂、眼前、眼下部及上胸有黑色闊帶，自頭頂側至後方有黑色之角狀附屬羽1對。後頭及後頸略帶薔薇色。背褐色，有暗色斑。體下部白色。（圖爲雄鳥）



1

2

3



1



2

1. 冰雞兒 *Anthus spinoletta Blakistoni* Swinhoe. 英名 Blakiston's Water-Pipit. 鶺鴒科

產於中亞細亞，冬季在我國及喜馬拉雅山附近出現。嘴較鷚科之鳥稍薄，上嘴端有細刻齒，尾長。雄者背面淡灰鼠色，有褐色縱斑。下部、眉斑及頭側淡黃色，上胸及體側有褐色縱斑。棲於松林等處，啄食昆蟲、蠕蟲、種子等。（圖爲雄鳥）

2. 大花鷚 *Anthus richardi richardi* Vieillot. 英名 Richard's Pipit. 鶺鴒科

繁殖於西伯利亞，冬季南下至我國、印度、歐洲、北非等處。體形甚大，酷似鷚類，但跗蹠極長，可資識別。翼約 90 毫米，略帶銹赤色，尾約 75 毫米。（圖爲雌鳥）

1. 黃馬蘭花兒 *Motacilla flava taivana* Swinhoe. 英名 Eastern Yellow Wagtail. 鶺鴒科


繁殖於我國黑龍江及貝加爾湖附近，冬季南下至我國南部、南洋羣島及馬來半島等處。體背部暗綠色，眉線黃色。冬羽及幼鳥之羽上部爲橄欖綠色，下部大部份白色。（圖爲雄鳥）

2. 黃顫兒(又名黃馬蘭花兒) *Motacilla flava simillima* Hartert. 英名 Eastern Blue-headed Wagtail. 鶺鴒科

繁殖於堪察加等處，在我國南部、日本及南洋羣島越冬。酷似上種之黃馬蘭花兒，但眉斑爲白色，是爲與上種不同處。（圖爲雄鳥）

3. 山鶺鴒 *Dendronanthus indicus* Gmelin. 英名 Forest Wagtail. 鶺鴒科

繁殖於西伯利亞東部及日本，冬季在我國南部、馬來地方、與他羣島等處。背面橄欖褐色，翼有黃色帶 2 條，眉線白色。體下部白色，脇橄欖灰色，胸有黑帶。本種有將尾左右擺動之習性。（圖爲雄鳥）



1



2



3



1



2

1. 馬蘭花兒(又名白顫)*Motacilla alba ocularis* Swinhoe. 英名 Streak-eyed Wagtail. 鶺鴒科

繁殖於西伯利亞東北部,冬季至我國南部海南島等處。在生殖期間背面灰色,頭頂黑色,腮有小白斑,喉全部黑色。冬季第二列撥風羽之外側羽大部份暗褐色或黑色。(圖爲雌鳥夏羽)

2. 黑背鶺鴒 *Motacilla grandis* Sharpe. 英名 Japanese Wagtail. 鶺鴒科

繁殖於日本北海道等處,我國北平附近亦有其踪跡。前額及眉線白色,背面黑色。腮有小白斑,頭側及喉黑色,胸以下白色。雄者鳴聲悅耳。(圖爲雄鳥)

1. 相思鳥 *Leiothrix lutea lutea* Scopoli. 英名 Chinese Red-billed Leiothrix. 知目鳥科

產於我國湖北、四川、江西、浙江、福建、廣東諸省及雲南東南部之山地。翼短，脚堅強。背面橄欖褐色，頭部略帶黃色。第一列撥風羽之基部外緣暗紅色，第二列撥風羽基部有黃色帶。眼前及圍眼部淡白色，頰綠褐色，喉黃色，上胸帶橙黃色，以下淡黃色。下尾筒黃色，雌鳥體色較暗。鳴聲甚美，動作活潑。營巢於草叢中或樹洞內，巢甚粗雜。食物爲昆蟲、種子、果實等。（圖爲雄鳥）

2. 畫眉 *Trochalopteron canorum canorum* Linnaeus. 英名 Hwamei. 知目鳥科

分布於我國陝西南部、湖北、江蘇、浙江、福建等處。鳴聲悅耳。額、頭頂、尾及翼之表面橄欖褐色，額及頭較赤。頭、後頸及翕有黑色軸斑。尾橄欖褐色，前端暗褐色，有不分明之橫斑。眉斑白色，甚長。體下部赭黃色，自喉至上胸有黑色軸斑。（圖爲雄鳥）



1



2



1

2

1. 綬鶲 *Tchitrea atrocaudata atrocaudata* Eyton. 英名 Japanese Paradise Flycatcher. 鶲科

產於日本及朝鮮,冬季在我國南部、台灣、馬來半島等處。體形甚小,嘴扁平,口角附近有剛毛。脚細弱。中央尾極長。雄者在生殖期內之頭、頸、及上胸天鵝絨黑色,體上部紫栗色。中央尾黑色,略帶紫色。脇黑褐色,體下部白色。在生殖期外,雌雄之尾均短,雌者背面栗色較濃。鳴聲特殊,性畏人,飛翔輕快,在空中捕食昆蟲。營巢於樹隙等處。(圖:左,雌;右,雄。)

2. 灰斑鶲 *Hemichelidom griseisticta* Swinhoe. 英名 Chinese Grey-spotted Flycatcher. 鶲科

繁殖於亞伯利亞東部及日本,冬季經我國南部至斐律賓、新幾內亞等處。背面汚褐色,大覆雨羽及第三列撥風羽有灰白色羽緣。體下部淡白色,胸部有暗褐色闊縱斑。幼鳥之背及翼有白斑。(圖爲雄鳥)

1. 緒練鵲（又名紫帶子、老白帶子） *Tchitrea paradisi incei* Gould. 英名 Chinese Paradise Flycatcher. 鶲科

分布於我國各地。體形酷似練鵲，然體色不同：成鳥背面栗赤色，略帶暗紫色。老鳥除頭部外，全體白色，惟背面各羽略帶黑色軸斑。羽冠綠色，上下嘴基部黑色，喉及頸深綠色，嘴脚蒼色。成鳥上胸淡綠褐色。（圖：左，雄老鳥；右，雄成鳥。）


2. 東方紅胸鶲 *Siphia parva albicilla* Pallas. 英名 Eastern Red-throated Flycatcher. 鶲科

繁殖於西伯利亞東部，冬季經我國至印度南部越冬。背面灰褐色，上尾筒及尾褐黑色，腮、自喉至上胸略帶銹黃赤色。上胸以下白色。脇略帶黃色。中央尾羽及外側羽前端之$\frac{1}{3}$黑褐色。

（圖爲雄鳥秋羽）



1



2



1



2

1. 郊鶲（又名麥鶲） *Siphia mugimaki* Temminck. 英名 Mugimaki Flycatcher. 鶲科

分布於日本及西伯利亞東部,冬季經我國南部、台灣至馬來半島及南洋羣島越冬。雄者之頭頂、上頸、頭側、頸側及背面暗褐色,近於黑色。翼、尾暗褐色。大、中覆雨羽及外側尾羽基部之$\frac{1}{2}$白色,眼後方有白線1條。體下部濃橙黃色,脇淡黃色,腹白色。雌者頭部及背面橄欖褐色。(圖:左,雄;右,雌。)

2. 黃鶲（北名鴨蛋黃兒，南名花頭黃） *Zanthopygia narcissina zanthopygia* Hay. 英名 Tricolor Flycatcher. 鶲科

繁殖於西伯利亞東部,冬季經我國至馬來半島越冬。雄者之背面,翼之大部份及尾黑色,翼有白色大斑。眉線白色,至老漸帶黃色。喉及胸檸檬黃色,腹淡黃色。雌者背面橄欖綠色,腰部有黃色闊帶。(圖:前,雄;後,雌。)

1. 赤腹鶇 *Turdus chrysolaus chrysolaus* Temminck.

英名 Japanese Brown Thrush. 鶇科

繁殖於西伯利亞東部及日本等處，冬季在我國南部及台灣。顏及喉黑色，頭頂與背同爲橄欖色。體下部呈狐赤色，甚美。雌者喉白色，喉側有褐色縱斑。（圖爲雄鳥）


2. 穿草雞 *Turdus naumanni* Temminck. 英名 Red-tailed Thrush. 鶇科

繁殖區域自葉尼塞至西伯利亞東部，秋季在我國黑龍江等處。背面褐灰色，多數有赤褐色斑紋，尾羽通常爲淡栗色，中央及外側羽之外緣灰褐色。喉茶褐色，有黑斑。喉以下同色。（圖爲雄鳥）



1





1



2

1. 中國灰叢樹石棲 *Rhodophila ferrea haringtoni* Hartert. 英名 Eastern Dark-grey Bush-chat. 鶲科

分布於我國湖北、福建、廣東、雲南、四川，及尼泊爾等處。背面灰褐色，各羽中央有黑斑。眉斑、腮、喉、腹、下尾筒及第三列撥風羽白色。胸淡灰色，翼及尾大部分黑色，尾之外緣灰色。秋季背面較黑。（圖爲雄鳥）

2. 藍尾巴根子（又名呼拉子、輕尾兒、藍點岡兒）*Ianthia cyanura cyanura* Pallas. 英名 Siberian Blue-tail. 鶲科

繁殖於我國北部、西伯利亞及日本，冬季至我國南部、印度等處越冬。雄者背面蒼色，翼褐色，羽緣蒼色，眉斑白色，尾羽之羽緣蒼色。腮、喉、上胸、下尾筒、下覆雨羽乳白色，下胸以下白色，體側略帶美麗之橙黃色。雌者背面橄欖褐色，上尾筒及尾羽之羽緣蒼色。（圖：前，雄鳥；後，雌鳥。）

1. 花紅燕兒 *Phoenicurus auroreus auroreus* Pallas.

英名 Daurian Redstart. 鶲科

繁殖於我國蒙古東部及西伯利亞東部，冬季在我國南部越冬。雄者頭頂及後頸暗灰鼠色，春季因羽緣磨損，致頭部呈灰白色。背、覆雨羽及翼黑色，翼有白色大斑。前額、眼前部、頭側及喉暗褐色。腰、上尾筒、體下部、及尾之大部份銹赤色。雌者背面、頭頂均爲赭灰褐色，喉淡赭色。（圖：左、雌；右、雄。）

2. 紅點頦(又名紅脖) *Luscinia calliope calliope* Pallas.

英名 Ruby-Throat. 鶲科

繁殖於我國北部、日本、及西伯利亞，冬季在我國南部、印度、斐律賓、馬來半島等處。雄者橄欖褐色，略帶赭色，喉紅色，頗美。眉斑白色，上胸側灰鼠色。體側褐色，腹之中部白色。雌者背面與雄同色，眉斑乳白色，喉白色，少數作淡紅色。（圖：前，雄；後，雌。）



1




2



1



2



3

1. 燕（北名拙燕、家燕） *Hirundo rustica gutturalis* Scopoli. 英名 Eastern House-Swarrow. 燕科

繁殖於西伯利亞東部及堪察加，在我國南部及印度越冬。嘴短平而闊，脚甚短小。翼長而尖，尾分叉極深。額及喉朱紅色，頭頂蒼色，背面蒼綠褐色，下部白色。飛翔甚速，在空中捕食昆蟲，營巢於人家屋內，巢爲半椀形，外部爲土，內部爲枯草及羽毛。（圖爲雄鳥）

2. 赤腰燕（北名巧燕） *Hirundo daurica nidalensis* Hodgson. 英名 Hodgson's Striated Swarrow. 燕科

繁殖於我國及日本。與燕相似，但後頸兩側有銹赤色斑。體下部淡黃色，有黑色細縱斑。腰及脇銹紅色，有黑色軸斑。上尾筒蒼黑色。（圖爲雄鳥）

3. 西伯利亞岩燕 *Delichon urbica whiteleyi* Swinhoe. 英名 Siberian House-Martin. 燕科

分布於我國北部、西伯利亞東部及堪察加等處，冬季在我國南部及緬甸。背面蒼黑色，有光澤，後頸羽基部白色。腰之下部及上尾筒白色，有時上尾筒有淡褐色斑。翼及尾烟褐色。尾部雖成叉狀，但外側羽並不如普通燕之尖長。脚趾被毛，白色。體下部白色，脇淡烟色。（圖爲雄鳥）

1. 鷦鷯 *Troglodytes troglodytes fumigatus* Temminck. 英名 Eastern Wren. 鷦鷯科

繁殖於日本。嘴直,跗蹠平滑。翼短圓,尾甚小。背面焦茶色,頭部略帶橄欖色。肩羽、下背、覆雨羽、腰、上尾筒及翼羽之外瓣有黑褐色細橫斑。中覆雨羽有小白斑數個。尾羽與背同色,有黑褐色橫斑。眉斑灰白色。體下部褐黃色,下尾筒前端白色。我國所產之鷦鷯係另一種,學名爲 *Troglodytes troglodytes idius*. 北名山蟈蟈兒。鳴聲悅耳。(圖爲雄鳥)

2. 暗黃臉鶲鶯 *Abroscopus superciliaris fulvifacies* Swinhoe. 英名 Formosan Yellow-bellied Flycatcher-Warbler. 鶯科

我國自四川至福建,各地均有分布。嘴細小,翼短闊。全體極小。背面橄欖褐色,腰淡黃色。頭頂赤褐色,兩側有黑色闊條紋。額及頭側栗色,腮及喉之羽毛白色,基部黑色。上胸有淡黃色闊橫帶,上胸以下白色,雌者體色相同。棲息林間,鳴聲甚美。爲留鳥。(圖爲雄鳥)

3. 柳鶯 *Acanthopneuste tenellipes* Swinhoe. 英名 Pale-legged Willow-Warbler. 鶯科

繁殖於黑龍江及日本, 冬季在我國南部、緬甸、及馬來半島北部。背面橄欖色,腰部略帶赭色。體下部白色,胸、脇及下尾筒略帶灰黃色。眉斑灰白色,翼有淡黃色橫帶 2 條。下嘴暗褐色,上嘴淡色。雌者體色相同。(圖爲雄鳥)

1




2



3





1



2



3

1. 黃尾根柳鶯 *Phylloscopus proregulus proregulus* Pallas. 英名 Pallas's Willow-Warbler. 鶯科

分布於亞洲北部,冬季至我國南部、印度等處。背面橄欖綠色,腰黃色。體下部白色,脇淡灰色。頭部中央線及眉斑硫黃色,翼有顯明之淡黃色帶2條,夏季則不甚顯明。(圖爲雄鳥)

2. 黃眉柳鶯 *Phylloscopus inornatus inornatus* Blyth. 英名 Yellow-browed Willow-warbler. 鶯科

繁殖於西伯利亞及中央亞細亞一帶,冬季在我國南部、印度、緬甸等處。背面橄欖綠色,下部淡黃色。頭部有不分明之黃灰色中央線,眉斑顯明,黃綠色。翼有橫帶2條。(圖爲雄鳥)

3. 蒼眉鵐 *Locustella fasciolata* Gray. 英名 Gray's Grasshopper-Warbler. 鶯科

繁殖於西伯利亞東部及日本,冬季經我國南下越冬。鳴聲頗似杜鵑。背面褐色,頭及後頸略帶橄欖色,腰及上尾筒略帶銹色,有灰白色細眉斑。喉及體下部之中央部分白色,上胸淡灰色,脇及下尾筒黃褐色。(圖爲雌鳥)

1. 剖葦（北名葦鶯、葦串兒，南名蘆零） *Acrocephalus stentoreus orientalis* Temm. & Schl. 英名 Eastern Great Reed-Warbler. 鶯科

繁殖於我國及西伯利亞東部等處，冬季南下。背面橄欖褐色，眉斑淡白色。體下部白色，脇及下尾筒淡黃色，喉部有不分明細縱斑。（圖為雄鳥）

2. 小剖葦（北名小葦鶯兒） *Acrocephalus bistrigiceps* Swinhoe. 英名 Von Schrenck's Reed-Warbler. 鶯科

繁殖於西伯利亞東部及日本朝鮮等處，冬季經我國南下至印度越冬。形小，背面黃褐色，頭、翼及尾略帶灰色，眉斑淡白色，上有暗褐色闊帶。過眼線黃褐色，腮及喉淡白色，胸及脇褐赤色，腹之中部及下尾筒淡黃色。（圖為雄鳥）



1



2



1



2

1. 太平鳥（又名十二黃連雀） *Bombycilla garrula centralasiae* Poljakov. 英名 Eastern Waxwing. 連雀科

繁殖於阿爾泰山，冬季至河北、江蘇及日本等處。嘴短，翼長而尖，跗蹠短縮。頭部有羽冠頗長。體上部葡萄灰褐色，腰部灰色較濃。下部體色稍淡，上胸以下灰色。前額，羽冠之側方及下尾筒栗赤色，眼前方，過眼線及喉黑色。第一列撥風羽外瓣前端淡黃色，第二列撥風羽前端白色，有紅色如蠟之小形附屬物。尾前端黃金色。常合羣飛翔，姿態頗美，有時且能高飛。食物爲昆蟲及漿果類種子等，鳴聲細小。（圖爲雄鳥）

2. 灰鵙（北名寒露兒） *Lanius sphenocercus sphenocercus* Cabanis. 英名 Chinese Great Grey Shrike. 鵙科

繁殖於我國蒙古及西伯利亞東部。體形甚大，嘴強，前端成鉤狀。跗蹠強大。背面灰色，第一列撥風羽基部及第二列撥風羽基部白色，翼有白斑 2 個。體下部白色，秋季胸及脇略帶薔薇色。飛翔頗速，成波狀。在空中或地面捕食食物。（圖爲雄鳥）

1. 伯勞（南名麻軋軋） *Lanius bucephalus* Temm. & Schl. 英名 Bull-headed Shrike. 鵙科

產於我國北部及西伯利亞東部，冬季在我國南部。雌雄異色，雄者體上部赤褐色，背以下橄欖灰色。眉斑淡黃色，過眼線及耳羽黑色，形成1闊帶。喉、胸、腹之中部白色，略帶乳色。體側及脇銹赤色。翼有小白斑。雌者過眼線褐色，翼無白斑。（圖：左，雌；右，雄。）

2. 虎鵙 *Lanius tigrinus* Drapiez. 英名 Thick-billed Shrike. 鵙科

繁殖於我國北部、西伯利亞東部及朝鮮等處，冬季南下。自頭頂至上背呈美麗之蒼灰色，上背以下赤褐色，有黑色橫斑。尾羽赤褐色，橫斑不顯明，前端白色。自前額連接過眼線及耳羽黑色，以下白色。雌者體色較暗，體側有橫斑，幼鳥有褐赤色橫斑。（圖爲雄鳥）

3. 褐色紅尾伯勞 *Lanius cristatus cristatus* Linnaeus. 英名 Indian Red-tailed Shrike. 鵙科

繁殖於西伯利亞北部及堪察加，冬季經我國南下越冬。前額灰白色。頭、背及尾呈美麗之赤褐色。過眼線及耳羽黑色，眉斑白色。體下部之喉及腹中部白色，其他部份略帶黃灰色。（圖爲雄鳥）




1



2



3



1



2



3

1. 東方倒攀山雀 *Remiz pendulinus consobrinus* Swinhoe. 英名 Chinese Penduline Tit. 四十雀科

分布於我國中部、日本及朝鮮。嘴短小，尾不甚長。前額與過眼線連接，呈黑色，頭部灰褐色，後頸鼠色。上背栗色，上背以下淡黃褐色。撥風羽及尾黑褐色，外緣淡黃色。喉及腮白色，喉以下體色較背稍淡。在樹枝上營垂巢，食物爲昆蟲、種子、果實等。（圖：前，雄鳥；後，幼鳥。）

2. 戴菊鳥 *Regulus regulus japonensis* Blakiston. 英名 Japanese Goldcrest. 四十雀科

分布於我國北部及西伯利亞東部。前額灰色，頭頂黃色，中央有赤橙色大斑，兩側有黑帶。背面橄欖色，腰淡黃色，翼之覆雨羽有白色大斑。體下部淡黃褐色。雌者頭頂無赤橙色羽。（圖：左，雌；右，雄。）

3. 河北鳥形山雀 *Suthora webiana fulvicauda* Campbell. 英名 Korean Crow-Tit. 四十雀科

產於我國河北及朝鮮，頭頂及上頸赤褐色。下背、腰、上尾筒及尾羽暗褐色。喉及胸淡葡萄色，撥風羽外緣栗色。（圖爲雄鳥）

另一種，學名 *S. w. webbiana* Gray. 稱爲黃頭，常被飼養作鬬鳥。

1. 陽明鳥（又名文鬚鳥） *Panurus biarmicus russicus* Brehm. 英名 Eastern Bearded Titmouse. **四十雀科**

分布於我國北部、歐洲中部、蘇聯南部、中亞西亞及西伯利亞東部。雄者頭部淡蒼灰色，自眼前方至頸側有黑色鬚狀羽。背面淡黃褐色，肩羽白色，略帶褐赤色。腹部淡黃色，尾銹赤色，外側羽前端灰色。雌鳥無鬚狀羽。營巢於地面附近呈盃形。（左，雄；右，雌。）

2. 黃鳥（北名黃鸝、南名黃鸚）*Oriolus chinensis diffusus* Sharpe. 英名 Black-naped Oriole. 黃鳥科

繁殖於我國及西伯利亞東部等處，冬季南下。嘴直長，跗蹠短，趾小。翼長，尾爲圓尾。全體黃金色。過眼線延長，在上頸會合，形成1黑頸帶。翼羽及尾羽黑色，羽緣黃色。嘴淡石竹色，脚淡鉛色，虹彩赤色。活動敏捷，鳴聲宛囀，飛行極快，食物爲昆蟲及果實。（左，幼鳥；右，成鳥。）



1



2


1
2

1. 風鳥 *Paradisea apoda* Linnaeus. 英名 Great Bird of Paradise. 風鳥科

產於新幾內亞附近之阿盧羣島 (Aru Is.),形小,體態甚美。嘴粗短,跗蹠強大。翼圓。雄鳥在生殖期內之額、頰及喉黑綠色,頭及頸黃色,其餘各處暗赤栗色。脇有長飾羽,基部橙黃色,中部黃色,前半部白色。中央尾羽僅存羽軸,延長成金屬線狀。雌鳥及雄鳥之非生殖羽均無飾羽。動作敏捷,棲於小丘峽谷等多樹之綠蔭中,合羣飛翔,頗速。(圖爲雄鳥)

2. 比翼鳥(又名王極樂鳥、帝王極樂鳥) *Cicinnurus regius* Linnaeus. 英名 King Bird of Paradise. 風鳥科

棲息於新幾內亞及其附近之島嶼中。雌雄異色,雄者體上部赤色,有橙黃色金屬光澤。眼上方有綠色斑點.喉紫赤色,有光澤;下有淡橙黃色之環狀帶,再下爲綠色環狀帶,有金屬光澤。胸側有短飾羽,有綠、黃、赤褐色斑紋。體下部白色,中央尾延長爲金屬線狀,前端有圓形綠羽。(圖爲雄鳥)

1. 烏鴉 *Corvus coronoides colonorum* Swinhoe. 英名 Jungle-Crow. 鴉科

本種產於長江下游,南至福建廣東。嘴長大,上嘴有刻齒。翼長而尖。全身亮黑色,如在強光之下,則背上有紫色光,頭頸有綠色光。喜羣棲。營巢於樹上,巢以樹枝等爲之,頗大。我國所產之烏鴉,尚有下列數種:

1. *Corvus coronoides mandschuricus*. 終年在東北部。

2. *Corvus coronoides hassi*. 終年在河北、山東、陝西一帶。


3. *Corvus coronoides tibetosinensis*. 分布於前藏、四川及雲南西部。

4. *Corvus coronoides hainanus*. 棲息於海南島。

5. *Corvus coronoides mengtszensis*. 常居於雲南東南部。

2. 白脖烏(北名白脖老鴰,南名玉頸鴉) *Corvus torquatus* Lesson. 英名 Collard Crow. 鴉科

產於我國南部。全體紫黑色,有光澤。上頸、上背、頸側及胸之白色部分形成一馬蹄形帶狀物。(圖爲成鳥)



1



2



1



2

1. 山烏（又名山老公，南名風鴉） *Corvus frugilegus pastinator* Gould. 英名 Eastern Rook. 鴉科

分布於我國，日本及西伯利亞東部。全體黑色，有紫色光澤甚強。成鳥頭前方及嘴基部之羽毛脫落，裸出。(圖爲成鳥)

2. 寒鴉(又名燕烏) *Corvus dauricus dauricus* Pallas. 英名 Daurian Jackdow. 鴉科

分布於我國及西伯利亞。體形較小，上頸、後頸、頸側、下喉及腹白色，其他各處黑色，有紫綠色光澤。(圖爲成鳥)

1. 鵲（俗名喜鵲） *Pica pica sericia* Gould. 英名 Chinese Magpie. 鴉科

分布於我國，緬甸、日本等處。頭、頸、背、胸、翼及尾黑色，有綠色及紫綠色光澤。腰暗白色，第一列撥風羽內瓣基部白色，肩羽及腹亦爲白色。（圖爲雄鳥）

2. 星鳥（又名葱花兒、葱頭翁） *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos* Brehm. 英名 Long-billed Nutcracker. 鴉科

分布於西伯利亞、我國東北部、朝鮮及日本。體呈朱古力黑色，頭側、頸及背之各羽均各有白色點狀斑1個，頭及上頸無斑，黑色。體下部亦有同樣斑點，惟形較大。（圖爲成鳥）



1



2



1



2

1. 管蓮子 *Spodiopsar cineraceus* Temminck. 英名 Grey Starling. 椋鳥科

東亞特產。分布於我國，日本及西伯利亞東南部。嘴細長，跗蹠強大，前面被蛇腹狀鱗。背面灰褐色，上尾筒白色，頭上部及頸黑色，額及頭側大部份白色。尾羽黑色，前端白色。上胸與脇褐色，腹及下尾筒白色。嘴脚橙黃色。棲息樹上，營巢於樹洞，人家屋內等處。食物爲果實、種子、昆蟲等。（圖爲雄鳥）

2. 噪林鳥 *Sturnia sinensis* Gmelin. 英名 Chinese Myna. 椋鳥科

繁殖於我國及台灣，冬季南下至交趾支那、馬來半島等處。頭、腮、眼前及圍眼部赭紅色，腰、上尾筒、脇及下尾筒同色。頸及背灰色，肩羽及覆雨羽白色，翼羽黑綠色。尾黑色，前端赭色。冬季赭色部改變爲灰白色。（圖；前，冬羽；後，夏羽。）

1. 印度革瑞克 *Gracula religiosa intermedia* A. Hay. 英名 Greater Hill-Myna. 椋鳥科

分布於我國南部,印度東南部、交趾支那、緬甸、暹羅等處。全體黑色,有紫色光澤。體下部略帶綠色。第一列撥風羽基部白色。後頸之肉垂與眼下裸出部相互連接,呈濃黃色。嘴脚橙黃色。(圖爲成鳥)

2. 紅肋粉眼 *Zosterops erythropleura erythroplura* Swinhoe. 英名 Chinese White-eye. 繡眼兒科

分布於我國北部。嘴直。翼短。背面淡橄欖綠色,頭頂及上尾筒黃綠色,腮、喉及下尾筒淡黃色,圍眼部白色。體下部乳白色,上胸及體側略帶灰色,脇有栗色闊縱帶。活動敏捷,喜合小羣棲息於林間。雄者鳴聲甚佳。捕食害蟲,故爲益鳥。營懸巢。(圖爲雌鳥)

另一種,學名 *Zosterops simplex simplex* Swinhoe. 英名 Chinese Silver-eye. 俗稱繡眼。

3. 旋木雀 *Certhia familiaris orientalis* Domaniewski. 英名 Eastern Tree-creeper. 旋木雀科


分布於我國東北部及烏蘇里。嘴細長,下方彎曲。趾爪頗長,尤以後趾爲甚。背面淡烟褐色,有淡白色縱斑。腰及上尾筒淡褐赤色。體下部銀白色,下腹、脇及下尾筒略帶淡黃色。尾羽軸堅強。營巢於朽木之間隙及洞內。(圖爲雄鳥)



1



2



3



1



2



3

1. 梅花雀 *Amandava amandava amandava* Linnaeus. 英名 Common Amanduvade. 文鳥科

產於雲南西南部、海南島、印度、爪哇等處。形小，嘴厚大，翼圓。雄者生殖羽深紅色，背、翼及尾羽前端黑褐色，各處有白色小圓點。生殖期外體呈暗栗褐色，腰深紅色，有白斑。雌者褐色，覆雨羽有小白斑，下腰及上尾筒暗赤色。營巨大之巢，頗惹人目。（圖：左，雄；右，雌。）

2. 文鳥 *Padda oryzivora* Linnaeus. 英名 Java Sparrow. 文鳥科

原產地在爪哇、蘇門答臘、馬來半島等處。頭黑，背面蒼灰色，上尾筒及尾黑色。頰有白色大斑。體下部淡葡萄色，下腹及下尾筒白色。（圖：左，雄；右，雌。）

3. 宗娥 *Lonchura atricapilla atricapilla* Vieillot. 英名 Blacd-headed Munia. 文鳥科


分布於緬甸南部，暹羅、馬來半島等處。頭、頸及上胸深黑色，腹之中央烟黑色，其餘部份栗色，有光澤。腰、上尾筒及中央尾羽之羽緣略帶金色光澤。（圖爲成鳥）

1. 錫嘴（北名老西兒） *Coccothraustes coccothraustes japonicus* Temm. & Schl. 英名 Japanese Hawfinch. 雀科

分布於日本及我國北部等處。嘴短厚，呈圓錐形，嘴峯銳利。翼尖，尾分叉。體上面朱古力褐色，頸輪灰鼠色。第一列覆雨羽及撥風羽呈天鵝絨黑色，有紫綠色光澤。營淺巢於小枝樹根等處，產卵數 4—6 個，食物以種子爲主，此外爲果實、幼芽、樹葉等。生殖期內捕食昆蟲及幼蟲。（圖爲雄鳥）

2. 桑鳸 *Eophona dersonata personata* Temm. & Schl. 英名 Japanese Grosbeak. 雀科

產於日本，四月在我國福建。全體蒼灰色，內側第二列撥風羽及腰灰褐色。頭頂、嘴基部及腮藍黑色，第一列撥風羽與頭同色，有白帶，尾亦同色。體下部淡灰色，腹中部白色。嘴暗黃色，脚肉黃色（圖爲雄鳥）。



1



2



1



2

1. **花雞**(北名燕雀、南名花鵲) *Fringilla montifringilla* Linnaeus. 英名 Brambling. 雀科

棲息於歐洲及亞洲北部,冬季南下至我國福建等處。雄者在生殖期內頭及背面蒼黑色,羽緣稍淡。下背及腰白色,喉及胸褐橙色,腹白。雌者背面褐色,各羽基部灰色,頭側有暗色帶,下部體色較雄者稍淡。(圖:左,雌;右,雄。)

2. **交喙鳥**(雄者又名紅交嘴,雌者又名青交嘴) *Loxia curvirostra japonica* Ridgway. 英名 Eastern Crossbill. 雀科

分布於我國、西伯利亞東部、及土耳其斯坦等處。本種下嘴前端向上與上嘴前端相交,故名。雄者體上面淡朱色或紅色,各羽有暗色縱斑。腰部朱色較濃。體下部亦呈朱色,惟腹之中部白色。雌者呈橄欖黃色,亦有暗色縱斑。體下部灰黃色,腹灰白色。(圖左,雌;右,雄。)

1. 鷽（又名拙老婆，北名灰兒） *Pyrrhula pyrrhula griseiventris* Lafresnaye. 英名 Oriental Bullfinch. 雀科

分布於我國北部、日本北部、及朝鮮等處，冬季在河北，三、四月在江蘇。雄者體上面蒼灰色，有時略帶薔薇色。體下部灰鼠色，有時亦略帶薔薇色。雌者體色較暗。（圖：左，雌；右，雄。）

2. 靠山紅 *Erythrina rosea* Pallas. 英名 Pallas's Rose-Finch. 雀科

繁殖於西伯利亞東部，在我國蒙古、中部及日本各地越冬。體上面薔薇色，翕及背有黑色縱斑。頭頂淡紅色，額眞珠白色，有光澤。體下部深薔薇色。雌者上部褐色，略帶薔薇色，有明顯之黑褐色軸斑。下部淡薔薇色，有褐色細縱斑。（圖：左，雄；右，雌。）



1



2


1
2

1. **金絲雀** *Serinus canarius canarius* Linnaeus. 英名 Canary-bird. 雀科

原種產於卡內利 (Canary) 羣島、馬得拉 (Madeira) 羣島、及阿左斯 (Azores) 羣島，近年歐人加以改良，本種為與原型最相近之家禽。全體黃色，嘴淡紅色，脚橙黃色，姿態甚美。原種本係野生，體上部灰黃色，有明顯之軸斑。(圖為成鳥)

2. **黃雀** (南名蘆花黃雀) *Carduelis spinus* Linnaeus. 英名 Siskin. 雀科

分布極廣，歐洲、北非、西伯利亞、我國、日本均有其踪跡。雄者頭頂黑色，背黃綠色，有黑褐色軸斑，翼及尾有黃色部份，喉有黑色斑。喉以下白色，體側有明顯之黑色軸斑。雌者頭部有褐黃綠色縱斑。(圖:前，雄;後，雌。)

1. 家雀 *Passer montanus saturatus* Stejneger. 英名 Japanese Tree-Sparrow. 雀科

產於我國北部、日本、西伯利亞，雌雄同色。頭及上頸朱古力色，略帶葡萄色。背面淡灰褐色，有黑色粗縱斑。耳羽後方及喉黑色。（圖：前，雄成鳥；後，幼鳥。）

2. 山麻雀 *Passer rutilans rutilans* Temminck. 英名 Russet Sparrow. 雀科

分布於我國及日本等處，體形較家雀稍小，雌雄異色。雄者背面呈美麗之深栗色，翕有黑色縱斑。耳羽無黑斑，喉黑褐色。雌者背面褐色，翕亦有黑縱斑。本種及家雀爲害鳥。（圖：前，雄；後，雌。）



1



2



1



2

1. 鳳頭雀 *Melophus melanicterus* Gmelin. 英名 Crested Black Bunting. 雀科

產於我國南部及緬甸、印度等處。雌雄異色:雄者背面蒼黑色,有光澤;頭部有羽冠頗長,約 27 毫米。覆雨羽及第一列撥風羽栗紅色,尾羽及下覆雨羽栗色。體下部與背同色,下尾筒栗紅色。雌者體色較褐,羽冠亦呈褐色。(圖爲雄鳥)

2. 寒雀(北名黃鵐)*Emberiza aureola aureola* Pallas. 英名 Yellow-breasted Bunting. 雀科

繁殖於蘇聯北部、西伯利亞、堪察加及日本北部，冬季南下至我國南部、暹羅、台灣、等處。雌雄異色:雄者背面赤栗色,有黑色縱斑。翼有大白帶。額、顏及上喉黑色,下喉黃色,前頸輪赤栗色,腹面黃色。雌者體上面縱斑較多,顏無黑色,亦無赤栗色頸輪。(圖:前,雄;後,雌。)

1. 黃眉 *Emberiza elegans elegans* Temminck. 英名 Yellow-throated Bunting. 雀科

產於我國、日本及西伯利亞東部。體上面栗褐色，翕有黑縱斑，頭頂黑色，形成長羽冠，後頭黃色。眼前方黃色，額有小白帶，頸灰鼠色，喉檸檬黃色，腮黑色，下喉有白帶。上胸有三角形黑斑，下胸以下白色。雌鳥全體暗色。（圖爲雄鳥）

2. 大眉子(南名金眉雀) *Emberiza chrysophrys* Pallas. 英名 Yellow-browed Bunting. 雀科

產於西伯利亞東部至北平一帶，在我國南部越冬。頭頂及頭側黑色，有白色細中央線，眉斑黃色。體上部赭褐色，有黑褐色縱斑。下部白色，喉側、胸側及脇有黑褐色縱斑。雌者體色較暗，下部斑點甚多。（圖爲雄鳥）



1



2



1



2

1. 鐵爪子(又名雪眉子) *Calcarius lapponicus coloratus* Ridgway. 英名 Eastern Lapland Bunting. 雀科

繁殖於可孟達羣島及堪察加,冬季在我國南部等處。本種之後趾甚長。雄者生殖期內頭、頸、喉及胸側黑色,眉斑及頸側白色,下頸及翕之上部栗赤色。背面銹赤色,有黑色縱斑。上胸黑色,上胸以下白色,脇有縱斑。雌者頭及背有褐色斑。(圖為雄鳥)

2. 葦容兒 *Emberiza schoeniclus pyrrhulinus* Swinhoe. 英名 Swinhoe's Reed-Bunting. 雀科

繁殖於日本,我國亦有其踪跡。雄者生殖期內頭、上頸及喉深黑色,後頸輪白色。體上部赤褐色,有黑縱斑。腰灰色,有暗色縱斑。小覆雨羽赤褐色,外側尾羽白色。體下部白色,脇有暗褐色縱斑。雌鳥頭部赤褐色。(圖:左,雄夏羽;右,雌鳥。)

中華民國二十五年九月初版

(52963·1)

中學生自然研究叢書 鳥類圖譜一冊 合售實價國幣壹元肆角

本叢書全部三十冊實價國幣拾陸元

外埠酌加運費匯費

版權所有 翻印必究

編譯者 沐紹良

主編者 王雲五 周建人

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

(本書校對者殷秀山)

中科院植物所图书馆
S0012952

58.8081 鳥类图譜(下册) 2668
126
24.

吴恩华 82.4.2

58.8081
126
24.

2668

復



